

Flobiotic®

Enrofloxacino

Injetável 5%

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Enrofloxacino 5 g

Veículos q.s.p. 100 mL

INDICAÇÕES:

FLOBIOTIC® INJETÁVEL 5% é indicado no tratamento de infecções causadas por bactérias gram-positivas, gram-negativas, espiroquetas e micoplasmas, sensíveis à enrofloxacino, em cães e gatos.

Cães e gatos: Piodermites causadas por *Staphylococcus spp.*, *E.coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus mirabilis* e *Pseudomonas aeruginosa*; infecções respiratórias causadas por *Pasteurella spp.*, *Staphylococcus spp.* e *Streptococcus spp.*; otites causadas por *Pseudomonas spp.*, *Staphylococcus spp.* e *Streptococcus spp.*; infecções geniturinárias causadas por *E.coli*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus spp.* e *Streptococcus spp.*

MODO DE USAR E POSOLOGIA:

FLOBIOTIC® INJETÁVEL 5% deve ser administrado por via subcutânea ou intramuscular nas seguintes dosagens:

Cães e gatos: 1,0 mL de FLOBIOTIC® INJETÁVEL 5% para cada 10 Kg de peso corporal (equivalente a 5 mg de enrofloxacino/Kg de peso), diariamente, durante 5 dias consecutivos. Não injetar volumes superiores a 10 mL do produto num mesmo local de aplicação.

O tratamento deve ser continuado por até 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS COLATERAIS:

O uso da Enrofloxacino é contraindicado em animais durante a fase de crescimento rápido, pois pode causar erosão das cartilagens das articulações.

No caso de cães de raças pequenas e médias, esta fase corresponde ao período entre 2 e 8 meses de idade; nas raças grandes esta fase pode se estender até os 12 meses e nas gigantes até 18 meses.

Não exceder a dosagem diária de 5 mg de enrofloxacino/Kg de peso corporal em gatos. Em raras situações, dosagens superiores à mencionada tem sido associada à toxicidade de retina.

Efeitos colaterais ou secundários raramente são graves a ponto de se interromper o tratamento. Os mais frequentes são náuseas e tontura. Distúrbios gastrintestinais incluindo dor abdominal, anorexia, vômito e diarreia também podem ser observados.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

A administração simultânea com a ciclosporina está associada com o aumento da creatina sérica.

Embora de incidência rara, a alcalinização urinária com bicarbonato de sódio, citratos ou inibidores da anidrase carbônica pode reduzir a solubilidade das fluoroquinolonas na urina, causando cristalúria e nefrotoxicidade.

Evitar a associação de quinolonas com complexos vitamínicos ou soluções que contenham Fe, Zn, Mn e Ca, pois eles podem reduzir a absorção das quinolonas. Não associar com sulfas e trimetoprima.

MODO DE CONSERVAÇÃO:

Conservar à temperatura ambiente (15°C a 30°C), em local seco e ao abrigo da luz solar direta.

APRESENTAÇÃO:

Frasco ampola contendo 10 mL, acondicionado em cartucho individual.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Dra. Vera de Fátima Costa Calixto - CRF/SP n° 11.427

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:

Syntec do Brasil Ltda.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP - CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

Indústria Brasileira